

Zalecenia konsultanta krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych

W obecnej sytuacji epidemiologicznej związanej ze stwierdzeniem transmisji lokalnej koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce, zgodnie z zaleceniami ECDC rekomenduje się przyjąć następujący sposób postępowania:

Osobą spełniającą kryteria przypadku podejrzanego o COVID-19 jest pacjent z ostrą infekcją dróg oddechowych o nagłym początku i przynajmniej z jednym z objawów:

kaszel, gorączka, duszność

Dodatkowo prawdopodobieństwo COVID-9 wzrasta, jeśli wystąpiło jedno z poniższych:

- a) ciężki stan wymagający hospitalizacji przy braku innej etiologii mogącej tłumaczyć obraz kliniczny.
- b) bliski kontakt z potwierdzonym lub prawdopodobnym przypadkiem COVID-19 w ostatnich 14 dniach.

W każdej jednostce ochrony zdrowia, do której się taka osoba się zgłosi, należy stosować następującą procedurę:

1. jeśli stan kliniczny pozwala **pacjent** wypełnia ankietę według załącznika 1,
2. **personel** jednostki ochrony zdrowia postępuje zgodnie z podanym poniżej algorytmem postępowania.

Każdy pacjent zgłaszający się do **każdej placówki ochrony zdrowia** POZ/ poradni specjalistycznej/SOR/Izby Przyjęć z podejrzeniem COVID-19 otrzymuje i zakłada **maskę** zakrywającą nos i usta oraz otrzymuje zalecenie zachowania **odległości co najmniej 2m od innych osób** i wypełnia **ankietę** (zał. 1)

ALGORYTM POSTĘPOWANIA – TRIAŻ w szpitalach niezakaźnych

Pacjent bezobjawowy – NAMIOT A (albo inny obszar czysty)

A1. Pacjent bezobjawowy

- Otrzymuje ulotkę informacyjną (zał. 2)
- Postępuje zgodnie z podanymi zaleceniami

A2. Pacjent bezobjawowy z kontaktu z osobą z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2

- Wypełnia ankietę (zał. 1)
- Postępuje zgodnie z podanymi zaleceniami
- Należy pobrać materiał w kierunku SARS-CoV-2 i zgłosić podejrzenie do PSSE
- Należy zorganizować transport do izolatorium lub innego miejsca wskazanego przez PSSE (w uzgodnieniu z dyspozytorem)

Pacjent z objawami – NAMIOT B (albo inny obszar brudny)

Ocena pielęgniarki/ratownika medycznego:
ciepłota ciała, liczba oddechów, SaO₂

B1. Pacjent skąpoobjawowy

T < 38 °C, liczba oddechów < 20/min, SaO₂ > 95 %

- Skierować do pomieszczenia zapewniającego izolację
- Konsultacja lekarska w ciągu 4 godzin

- Pobrać materiał w kierunku SARS-CoV-2
- Zgłosić podejrzenie do PSSE
- Włączyć leczenie objawowe
- Odesłać do izolatorium lub innego miejsca wskazanego przez PSSE

O wyniku badania i dalszych zaleceniach Pacjenta informuje pracownik PSSE

Przyjęcie do oddziału/kliniki odpowiedniego dla stanu pacjenta

B2. spełniony **którykolwiek** z warunków:

T > 38 °C, liczba oddechów > 20/min; SaO₂ < 95%

- Skierować na SOR/IP do pomieszczenia zapewniającego izolację
- **konsultacja lekarza w pierwszej kolejności**
- wdrożenie postępowania ratującego życie, jeśli niezbędne (w oddziale przejściowym lub w inny sposób zapewniający odizolowanie pacjenta)

- Pobrać badania w kierunku SARS-CoV-2
- Zgłosić podejrzenie do PSSE

Negatywny wynik badania

Pozytywny wynik = wykryto SAR-CoV-2 RNA

Kontakt z najbliższym oddziałem zakaźnym dedykowanym COVID-19

Telefon.....